

Suivi biologique des patients HPN sous Inhibiteur du Complément

CHECK LIST AVANT ENVOI

- ☐ Attention : étude des dépôts de C3 sur le clone HPN tube non centrifugé à température ambiante délai d'acheminement <48h
- ☐ Type de traitement
- ☐ Bon de commande

PATIENT	PRESCRIPTEUR
NOM :	Hôpital :
NOM DE NAISSANCE :	Service :
Prénom :	Téléphone/Fax :
Date de naissance :	Médecin prescripteur :
Sexe :	Mail :

PRELEVEMENT SANGUIN : 2-3 vacutainers mauve (EDTA) à $\pm 4^{\circ}\text{C}$ et devant être réceptionnés par le laboratoire dans les **3 heures** suivant le prélèvement. Si ce délai ne peut être respecté, centrifuger et envoyer 6 aliquots étiquetés + le tube primaire à -80°C .

- CD46, HPN, CD55, CD59, dépôt de C3 : 1 tube EDTA à température ambiante expédié dans les 48h.

Date de prélèvement : / / Heure de prélèvement : h Préleveur :

- ☐ Le patient a exprimé son opposition à la conservation et à l'utilisation de ses échantillons à des fins non diagnostiques.

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES (merci de joindre tout document relatif à l'indication)

!! Les prescriptions peuvent être modifiées par le biologiste compte tenu des renseignements cliniques ou des antécédents du patient

Traitement bloqueur du complément :

- ☐ Eculizumab (Soliris); date d'injection :
- ☐ Ravulizumab (Ultomiris); date de début :
- ☐ Crovalimab (Imfinzi); date de début :
- ☐ Pegcetacoplan (Aspaveli) ; date de début :
- ☐ Iptacopan ; posologie, date de début :
- ☐ Autre :

Analyses effectuées :

- ☐ Complément Total (CT), C3, C4, +/- dosages des fragments d'activation, +/- dosage du médicament (résiduel)
 - o 1 tube EDTA
 - o Envoi dans les 3 h après le prélèvement ne pas centrifuger, à envoyer à 4°
 - o Envoi >3 h après le prélèvement: centrifuger les tubes à $+4$, faire 6 aliquots identifiés, congeler et envoyer à -80°
- ☐ Clone HPN : Etude des dépôts de C3 à la surface des GR
 - o 1 tube EDTA
 - o **Attention : ne pas centrifuger ; envoi à température ambiante dans les 48h après le prélèvement**